

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP - 5 - 2 - 70 017725

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

MONILIA DE L'ABRICOTIER

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER

Le 10 février 1970

Le mois de janvier 1970 a connu dans la région de Montpellier une pluviométrie excessivement importante, les pluies réparties sur l'ensemble du mois; par contre en Roussillon les conditions climatiques ont été voisines de la normale, l'hygrométrie relative étant cependant très élevée. Par ailleurs et en comparaison avec la situation existante il y a un an, on observe seulement en fin de janvier la maturité des germes de Monilia.

Il importe donc, avant que la moyenne des boutons floraux n'aie dépassé le stade B, d'exécuter un traitement minutieux à l'aide d'un produit cuprique.

Un deuxième traitement avant le début du stade D (toujours sur 50% des fleurs) puis un troisième traitement au stade F (floraison) seront réalisés avec du Zirame, du thirame, du captane, du captafol, ou du soufre; ce dernier produit étant spécialement recommandé dans les vergers où l'Oïdium de l'abricotier s'est manifesté.

Les traitements lavés par la pluie seront renouvelés.

En cas de développement anormal de la maladie la Station donnera de nouvelles directives.

CLOQUE DU PECHER

La Cloque du pêcher provoque des altérations du feuillage qui nuisent considérablement à la végétation; en outre la Cloque peut déformer les fruits et les rendre impropres à la commercialisation. Des études précises ont permis d'affirmer que les contaminations les plus graves se produisent dès le début du gonflement des bourgeons. Il faut donc que les arbres reçoivent immédiatement une protection

Utiliser une bouillie à base de cuivre, de zirame, de thirame, captane, ferbane, captafol.

AVIS AUX CULTIVATEURS DE PRUNIER

La Station aimerait connaître les Noms d'abonnés producteurs de prunes.

L.L.TROUILLON

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

RHIZOCTONE VIOLET DE L'ASPERGE

Indépendamment de diverses mesures générales, d'ordre cultural surtout, que l'on doit respecter pour éviter l'installation d'une aspergière en terre susceptible d'être contaminée par la maladie et pour limiter certains risques dus à des facteurs favorisants, la désinfection des griffes avant plantation est une excellente précaution.

Si elle n'a pas déjà été pratiquée par le pépiniériste elle sera réalisée en trempant les griffes pendant 15 minutes dans de l'eau de Javel à 12° chlorométrique (soit un sachet de 250cc du commerce à 48° chlorométrique dans un litre d'eau). Laisser égoutter et rincer abondamment à l'eau courante. Planter de suite après.

MILDIOU DU POIREAU

Les précipitations, relativement faibles de la dernière semaine du mois de janvier (mais assez fréquentes dans presque tous les secteurs); accompagnées d'un adoucissement des températures ont favorisé les attaques de Mildiou sur poireaux en de nombreux endroits.

La protection doit donc être maintenue et renouvelée après de fortes pluies. Utiliser un fongicide organique de synthèse (Manèbe, Mancozèbe, Propinèbe, etc...) Ajouter toujours un mouillant à la bouillie.

P. CHRESTIAN

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE